

WYPEŁNIA ZDAJĄCY

KOD

--	--	--

PESEL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę.

Sprawdź, czy kod na naklejce to

E-100.

Jeżeli tak – przyklej naklejkę.

Jeżeli nie – zgłoś to nauczycielowi.

Egzamin maturalny

Formuła 2015

MATEMATYKA

Poziom podstawowy

Symbol arkusza

EMAP-P0-**100**-2506

DATA: **4 czerwca 2025 r.**

GODZINA ROZPOCZĘCIA: **9:00**

CZAS TRWANIA: **170 minut**

LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: **50**

WYPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

☐ Uprawnienie zdającego do
dostosowania w związku z dyskalkulią.


Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem egzaminacyjnym

1. Sprawdź, czy nauczyciel przekazał Ci **właściwy arkusz egzaminacyjny**,
tj. arkusz we **właściwej formule**, z **właściwego przedmiotu** na **właściwym poziomie**.
2. Jeżeli przekazano Ci **niewłaściwy** arkusz – natychmiast zgłoś to nauczycielowi.
Nie rozrywaj banderol.
3. Jeżeli przekazano Ci **właściwy** arkusz – rozerwij banderole po otrzymaniu
takiego polecenia od nauczyciela. Zapoznaj się z instrukcją na stronie 2.



Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 31 stron (zadania 1–34).
Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.
2. Na pierwszej stronie arkusza oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.
3. Odpowiedzi do zadań zamkniętych (1–25) zaznacz na karcie odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla zdającego. Zamaluj  pola do tego przeznaczone. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz właściwe.
4. Pamiętaj, że pominięcie argumentacji lub istotnych obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego (26–34) może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów.
5. Rozwiązania zadań i odpowiedzi wpisuj w miejscu na to przeznaczonym.
6. Pisz czytelnie i używaj tylko długopisu lub pióra z czarnym tuszem lub atramentem.
7. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
8. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.
9. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
10. Możesz korzystać z *Wybranych wzorów matematycznych*, cyrkla i linijki oraz z kalkulatora prostego. Upewnij się, czy przekazano Ci broszurę z okładką taką jak widoczna poniżej.



**Zadania egzaminacyjne są wydrukowane
na następnych stronach.**

W każdym z zadań od 1. do 25. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawną odpowiedź.

Zadanie 1. (0–1)

Liczba 0,1 jest jednym z przybliżeń liczby $\frac{1}{8}$.

Błąd względny tego przybliżenia, wyrażony w procentach, jest równy

- A. 0,2% B. 0,25% C. 20% D. 25%

Zadanie 2. (0–1)

Liczba $256 \cdot \sqrt[3]{8^2}$ jest równa

- A. 2^8 B. 2^{10} C. 2^{16} D. 2^{36}

Zadanie 3. (0–1)

Liczba $(\sqrt{3} + 1)^2 - \sqrt{12}$ jest równa

- A. $4 - 4\sqrt{3}$ B. $4 - 2\sqrt{3}$ C. 2 D. 4

Zadanie 4. (0–1)

Liczba $2 + \log_3 5$ jest równa

- A. $\log_3 7$ B. $\log_3 10$ C. $\log_3 25$ D. $\log_3 45$

Zadanie 5. (0–1)


Dana jest nierówność

$$8 - \frac{1 - 2x}{2} \geq 3x$$

Największą liczbą całkowitą, która spełnia tę nierówność, jest

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)




Zadanie 6. (0–1)

Równanie $4(x-1)^2(x^2-25)=0$ w zbiorze liczb rzeczywistych ma dokładnie

- A. dwa rozwiązania.
- B. trzy rozwiązania.
- C. cztery rozwiązania.
- D. pięć rozwiązań.

Informacja do zadań 7.–8.

Na rysunku, w układzie współrzędnych (x, y) , przedstawiono wykres funkcji f .

**Zadanie 7. (0–1)**

Dziedziną funkcji f jest przedział


- A. $(-5, 3)$ B. $\langle -5, 3 \rangle$ C. $\langle -1, 2 \rangle$ D. $\langle -1, 2 \rangle$

Zadanie 8. (0–1)

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności $f(x) < f(-3)$ jest przedział

- A. $(-5, -3)$ B. $(-5, -3)$ C. $\langle -3, 1 \rangle$ D. $(-3, 1)$

BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)



Zadanie 9. (0–1)

Funkcja liniowa f jest określona wzorem $f(x) = \frac{1}{2}x - k$, gdzie k jest liczbą rzeczywistą. Miejsce zerowe funkcji f jest liczbą większą od 2.

Liczba k należy do przedziału

- A. $(-\infty, -1)$ B. $(-1, 0)$ C. $(0, 1)$ D. $(1, +\infty)$

Zadanie 10. (0–1)

Funkcja liniowa f jest określona wzorem $f(x) = 5x$. W układzie współrzędnych (x, y) wykres funkcji f przesunięto o jedną jednostkę w prawo wzdłuż osi Ox i w wyniku tego przesunięcia otrzymano wykres funkcji liniowej g .

Funkcja g jest określona wzorem

- A. $g(x) = 5x - 5$ B. $g(x) = 5x - 1$
C. $g(x) = 5x + 1$ D. $g(x) = 5x + 5$

Zadanie 11. (0–1)

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem $f(x) = (500 + 50x)(16 - x)$.

Największa wartość funkcji f w przedziale $\langle 0, 14 \rangle$ jest równa

- A. $f(3)$ B. $f(4)$ C. $f(7)$ D. $f(14)$

Zadanie 12. (0–1)

Funkcja f jest określona wzorem $f(x) = 64^x$ dla każdej liczby rzeczywistej x .

Liczba $f\left(-\frac{2}{3}\right)$ jest równa

- A. $\frac{1}{512}$ B. $\frac{1}{16}$ C. 16 D. 512

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Zadanie 13. (0–1)

Ciąg (a_n) jest określony wzorem $a_n = 3n^2 - 3n$ dla każdej liczby naturalnej $n \geq 1$.

Suma S_3 trzech początkowych kolejnych wyrazów ciągu (a_n) jest równa

- A. 18 B. 24 C. 60 D. 90

Zadanie 14. (0–1)


Trzywyrazowy ciąg $(4, m, m - 1)$ jest geometryczny, gdy liczba m jest równa

- A. (-3) B. (-2) C. 2 D. 3

Zadanie 15. (0–1)

Dany jest trójkąt prostokątny o kątach ostrych α oraz β (zobacz rysunek).

Sinus kąta α jest równy $\frac{4}{7}$.



Cosinus kąta β jest równy


- A. $\frac{3}{7}$ B. $\frac{4}{7}$ C. $\frac{\sqrt{33}}{7}$ D. $\frac{4}{\sqrt{33}}$

Zadanie 16. (0–1)

Liczba $\frac{\sin^3 25^\circ + \sin 25^\circ \cdot \cos^2 25^\circ}{\cos 25^\circ}$ jest równa


- A. $\sin 25^\circ$ B. $\cos 25^\circ$ C. $\operatorname{tg} 25^\circ$ D. 1

BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)



Informacja do zadań 17.–18.

Dany jest trójkąt prostokątny o bokach długości 10, 24, 26 (zobacz rysunek).

**Zadanie 17. (0–1)**

Długość promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równa


- A. $\frac{10}{3}$ B. 4 C. 5 D. $\frac{80}{13}$

Zadanie 18. (0–1)

Długość promienia okręgu opisanego na tym trójkącie jest równa


- A. $\frac{80}{13}$ B. $\frac{20}{3}$ C. 12 D. 13

BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)



Zadanie 19. (0–1)

Na dziesięciokącie foremnym $ABCDEFGHIJ$ opisano okrąg o środku w punkcie S (zobacz rysunek).




Miara kąta wpisanego AGD jest równa

- A. 18° B. 36° C. 54° D. 60°

Zadanie 20. (0–1)


Kwadrat $\mathcal{K}_2$ jest podobny do kwadratu $\mathcal{K}_1$ w skali 5 (zobacz rysunek).
Suma pól tych kwadratów jest równa 78.



Długość boku kwadratu $\mathcal{K}_1$ jest równa

- A. $\sqrt{3}$ B. 3 C. $\sqrt{13}$ D. 13

BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)



Zadanie 21. (0–1)

W układzie współrzędnych (x, y) dana jest prosta k o równaniu $y = x - 4$. Prosta l jest obrazem prostej k w symetrii osiowej względem osi Oy układu współrzędnych.

Prosta l jest określona równaniem

A. $y = x - 4$

B. $y = x + 4$

C. $y = -x - 4$

D. $y = -x + 4$

Zadanie 22. (0–1)

Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 20. Pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest cztery razy większe od pola jego podstawy. Długość krawędzi podstawy tego ostrosłupa jest równa

A. 2

B. $\sqrt{5}$

C. $\sqrt{10}$

D. 4

Zadanie 23. (0–1)

Tworząca stożka ma długość 6. Kąt rozwarcia tego stożka ma miarę 60° . Wysokość tego stożka jest równa

A. 3

B. $2\sqrt{3}$

C. $3\sqrt{3}$

D. $3\sqrt{5}$

Zadanie 24. (0–1)

Wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych parzystych, w których zapisie dziesiętnym występuje dokładnie jeden raz cyfra 0, jest

A. 108

B. 117

C. 126

D. 162

Zadanie 25. (0–1)

Średnia arytmetyczna trzech liczb: a , b , c , jest równa 12.

Średnia arytmetyczna sześciu liczb: $2a$, $3a$, $2b$, $3b$, $2c$, $3c$, jest równa


A. 10

B. 12

C. 30

D. 60


BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)



Zadanie 26. (0–2)

Rozwiąż nierówność


$$x(x + 4) < x - 2$$



Zadanie 27. (0–2)

Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej $x \neq 2$ i dla każdej liczby rzeczywistej y prawdziwa jest nierówność

$$x^2 + y^2 > 4(x + y - 2)$$



Zadanie 28. (0–2)

W maju 2024 roku założono dwa sady: posadzono w nich łącznie 1410 drzew.

Po roku stwierdzono, że uszło 20% drzew w pierwszym sadzie i 15% drzew w drugim sadzie. Uschnięte drzewa usunięto, a nowych nie dosadzano.

Liczba drzew, które pozostały w drugim sadzie, stanowiła 70% liczby drzew, które pozostały w pierwszym sadzie.


Oblicz, ile drzew posadzono w pierwszym sadzie w maju 2024 roku.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Zadanie 29. (0–2)

Ciąg arytmetyczny ma dwadzieścia pięć wyrazów, a suma wszystkich jego wyrazów jest równa 2025. Ostatni wyraz tego ciągu jest 17 razy większy od pierwszego wyrazu tego ciągu.

Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu.

A large grid of graph paper, consisting of 25 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to show their calculations.

Zadanie 30. (0–2)

W tabeli zestawiono liczbę punktów uzyskanych przez 32 uczniów pewnej klasy za rozwiązanie jednego z zadań ze sprawdzianu z matematyki.

Liczba punktów	0	1	2	3	4	5
Liczba uczniów, którzy otrzymali daną liczbę punktów	4	2	5	5	11	5

Oblicz średnią arytmetyczną oraz medianę liczby punktów otrzymanych przez tych uczniów za rozwiązanie tego zadania.


This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Zadanie 31. (0–2)

Dane są dwa zbiory: $X = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2\}$ oraz $Y = \{-2, -1, 0, 1\}$.

Losujemy jedną liczbę ze zbioru X , a następnie losujemy jedną liczbę ze zbioru Y i tworzymy uporządkowaną parę liczb (x, y) , gdzie x jest liczbą wylosowaną ze zbioru X oraz y jest liczbą wylosowaną ze zbioru Y .

Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że wylosujemy parę liczb (x, y) , która będzie spełniać warunek $x \cdot y \geq 0$.





Zadanie 32. (0–4)

W układzie współrzędnych (x, y) wykres funkcji kwadratowej f przechodzi przez punkt $(2, 15)$. Ośią symetrii tego wykresu jest prosta o równaniu $x = -1$.

Jednym z miejsc zerowych funkcji f jest liczba 1 .

Wyznacz wzór funkcji f w postaci kanonicznej oraz zbiór wartości funkcji f .







Zadanie 33. (0–4)

Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu jest równe 94,5.

Długości trzech krawędzi wychodzących z tego samego wierzchołka prostopadłościanu tworzą ciąg geometryczny o ilorazie równym 4.

Oblicz objętość tego prostopadłościanu.







Zadanie 34. (0–5)


W układzie współrzędnych (x, y) punkty $A = (0, 1)$ oraz $C = (6, 4)$ są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu $ABCD$. Prosta k o równaniu $y = ax + b$ przechodzi przez wierzchołki B oraz D tego kwadratu.


Oblicz pole tego kwadratu oraz wyznacz współczynniki a oraz b w równaniu prostej k .





BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)





MATEMATYKA

Poziom podstawowy

Formuła 2015

MATEMATYKA

Poziom podstawowy

Formuła 2015

MATEMATYKA

Poziom podstawowy

Formuła 2015